


---

**PARES  
BIOMAGNÉTICOS  
REGULARES  
ABDOMEN**

# SUPRA HEPÁTICO – SUPRA HEPÁTICO



PATÓGENO:

**CLOSTRIDIUM MALIGNUM** (bacteria)

---

# CLOSTRIDIUM MALIGNUM

## Contagio

De persona a persona al hablar,  
toser o estornudar



## Sintomatología

- Peligroso por ser anaeróbico.
- Problema pulmonar severo.
- Somnolencia, estupor, coma.
- Favorece las metástasis.
- Con el tripanosoma Gambi dan absceso en mamas.



---

# HÍGADO – RIÑÓN IZQ.



PATÓGENO:

**AMEBA HEPÁTICA** (parásito)

Dr. César Rivadeneira

**Absceso**

---

---

# AMEBA HEPÁTICA (Absceso)

## Contagio

Vía oral



## Sintomatología

- Ocurre cuando la ameba se pasa del píloro al hígado causando un absceso.
- Hipocondralgia derecha.
- Escalofríos, fiebre, sudores, malestar general.
- Diarrea, ictericia, artralgia.
- Pérdida de peso.



---

# HÍGADO – PÍLORO



PATÓGENO:

**LISTERIA**

**(Bacteria)**

---


# LISTERIA

## Contagio

Por piel de cerdo. Vía oral


## Sintomatología

- Como cirrosis hepática.
- Causante de infecciones alimentarias más virulentos.
- Dolor de articulaciones, sobre todo en la zona de las rodillas.
- Falso vitíligo.
- DESAJUSTE DE LA CREATININA.



---

# PERI HEPÁTICO – PERI HEPÁTICO



PATÓGENO:

**MORGANELLA TIFO (BACTERIA)**

---

# MORGANELLA TIFO

## Contagio


Por caries, mariscos o pescados, fecal oral.

## Sintomatología

- Anorexia total, trastornos digestivos tipo tifoideos, con diarreas.
- Pruebas febriles son positivas.
- Produce moco y pus en el borde del hígado.
- Se confunde con cirrosis hepática.



# COSTO HEPÁTICO - COSTO HEPÁTICO



PATÓGENO:

**BORRELIA** (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

---

# BORRELIA

## Contagio



Por garrapatas, picaduras de insectos en áreas húmedas y calurosas.

## Sintomatología

- Enfermedad de Lyme.
- Celulitis.
- Afecta el estómago, píloro, riñón.
- Puede dar insuficiencia renal.
- Da megacolon, elefantiasis.
- Fatiga crónica, fibromialgias, esclerosis múltiple, lupus, ELA.



# LIGAMENTO HEPÁTICO-RIÑÓN DERECHO



PATÓGENO:

Dr. César Rivadeneira  
**ADENO VIRUS**

---


# ADENO VIRUS

## Contagio

Vía aérea, vía fecal-oral



## Sintomatología

- Adenitis.
- Fiebre.
- Bronquitis, neumonías.
- Distensión de abdomen, diarreas.
- Cistitis hemorrágicas.
- Inflamación ganglionar y glandular, falso VIH.



---

# VESÍCULA – RIÑÓN DERECHO



PATÓGENO:

**CATARRO COMÚN**

(Virus)

---

# CATARRO COMÚN

## Contagio

Vía aérea, persona a persona por medio de las secreciones. Objetos contaminados.



## Sintomatología

- Estornudos, secreción nasal, dolor de cabeza, goteo y congestión nasal, ojos llorosos, picor.
- Dolor o flema en la garganta, tos, cansancio.
- Sensación de malestar general.



---

# CONDUCTO DE LA VESÍCULA – RIÑÓN DERECHO



PATÓGENO:

**ESPIROQUETA 2** (Bacteria)

---


# ESPIROQUETA 2

## Contagio

Por secreción de la piel afectada,  
contacto sexual.



## Sintomatología

- Produce diabetes falsa, sobrepeso,  
desactiva la producción de insulina.



---

# CONDUCTO PANCREÁTICO – RIÑÓN D - I



PATÓGENO:

**ESPIROQUETA 1** (Bacteria)

---


# ESPIROQUETA 1

## Contagio

Por secreción de la piel afectada,  
contacto sexual.



## Sintomatología

- Produce diabetes falsa, sobrepeso,  
desactiva la producción de insulina.



# PÍLORO - HÍGADO

## Hepatitis J



PATÓGENO:

**OXIUROS** (Parásito)

# OXIURO

## Enterobacter Vermiculares

### Contagio

De persona a persona, ropa de cama, alimentos, agua contaminada con los huevos del oxiuro.



### Sintomatología

- Prurito intenso alrededor del ano, irritación e infección alrededor del ano
- Irritabilidad
- Interrupción del sueño
- Irritación o molestia vaginal
- Problemas gastro hepáticos



---

# PÍLORO - LENGUA D/I



PATÓGENO:

**TRIQUINA** (Parásito)

# TRIQUINA

## Contagio

Carne mal cocida, de cerdo, oso, morsa, zorro, rata, caballo y león.



## Sintomatología

- Síntomas gastro intestinales, cólicos, diarrea.
- Edema facial alrededor de los ojos, fiebre, dolor muscular y articular, debilidad muscular.
- Las larvas pueden llegar al cerebro y se enquistan.



---

# PÍLORO - RIÑÓN



PATÓGENO:  
**AMEBIASIS INTESTINAL (parásito)**


# AMEBIASIS INTestinal

## Contagio

Agua y alimentos contaminados por heces.



## Sintomatología

- Falsa diabetes.
- Sabor a vomito o metal en la boca.  
Síntomas gastro intestinales (diarreas), dolores abdominales.
- Falta de apetito.



---

# PÍLORO - URETER



PATÓGENO:

**CANDIDA ALBICANS** (Hongo)

---

Dr. César Rivadeneira

---

# CANDIDA ALBICANS

## Contagio

Ropa, objetos, contacto sexual, sistema inmune deficiente.



## Sintomatología

- Algodoncillo, parálisis del diafragma al lastimar el bulbo.
- Micosis vaginal con olor a levadura, recto y ojo
- Lesiones cutáneas, prurito y sarpullido.



---

# DUODENO – RIÑÓN IZQ.



PATÓGENO:

**CLAMYDIA TRACHOMATIS 1** (Bacteria)

---


# CLAMYDIA TRACHOMATIS

## Contagio

Falta higiene en lugares húmedos o bien por enfermedades de transmisión sexual.

## Sintomatología


- Altera factores de coagulación
- Hemorragias de todo tipo, vaginal rectal o uretral. Sangrado masivo.
- Ceguera. Desprendimiento de la retina. Produce Pterigium.
- Cáncer uterino. Psoriasis falsa.



\* *Duodeno / Hígado*

---

# DUODENO – HÍGADO



PATÓGENO:

**CLAMYDIA TRACHOMATIS 2** (Bacteria)

---


# CLAMYDIA TRACHOMATIS

## Contagio

Falta higiene en lugares húmedos o bien por enfermedades de transmisión sexual.


## Sintomatología

- Altera factores de coagulación
  - Hemorragias de todo tipo, vaginal rectal o uretral. Sangrado masivo.
  - Ceguera. Desprendimiento de la retina. Produce Pterigium.
  - Cáncer uterino. Psoriasis falsa.
- \* *Duodeno / Riñón izquierdo*



---

# APÉNDICE – LENGUA



PATÓGENO:

**VIRUELA** (Virus)

---

Dr. César Rivadeneira

---


# VIRUELA

## Contagio

Contacto directo, vía aérea.

## Sintomatología


Dermatitis atópica, verruga plana. Se confunde con acné, herpes 1, uretritis, vaginitis. Problemas de pene. Asociado con una bacteria produce verrugas planas. Síntomas Neurológicos (Cefalea, mareo, náusea, vómito, Desmielinización y ceguera)



EL VIRUS MAS AGRESIVO

---

# APÉNDICE – FEMORAL VENA



PATÓGENO:

● ●  
**Vaccinia Virus**

---

Dr. César Rivadeneira (Virus)

---

# VACCINIA VIRUS

## Contagio

Vacuna de la Viruela.


## Sintomatología

Dermatológico (exantema maculopapular rosado pruriginoso con formación en el sitio de la vacuna)

Protocolo para vacunas:

- Vacuna – Riñón (mismo lado)
- Vacuna – Vacuna (PB anti simétrico individual)

El protocolo para vacunas puede ser impactado con doble polaridad



# APÉNDICE - PLEURA



PATÓGENO:

**ESTAFILOCOCO AUREUS COAGULASA +**

(Bacteria)

Dr. César Rivadeneira


# **ESTAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVO**

## **Contagio**

Contaminación de heridas o quemaduras, por material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados.



## **Sintomatología**

- Pericarditis, arritmia y patología cardíaca.
- Laringe-traqueítis.
- Forúnculos, impétigo, celulitis,
- Neumonía , septicemia, vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal y calambres,
- Fiebre e hipotensión.



---

# VÁLVULA ILEOCECAL – RIÑÓN DERECHO



PATÓGENO:

**TRICOMONAS 1** (Parásito)

---

# TRICOMONAS


## Contagio

Vía Sexual, objetos contaminados.

## Sintomatología


- Trastornos digestivos.
- Hemorragias transvaginales, escozor y ardor zona pélvica.
- Un flujo vaginal espumoso, amarillo verdoso y con un fuerte olor.
- Molestias durante la relación sexual o al orinar, irritación y picazón en el área genital de la mujer.

\* *Ciego / Ciego*      *Ciego / Riñón derecho*



---

# CIEGO - CIEGO



PATÓGENO:

**TRICOMONAS 2** (Parásito)

---

Dr. César Rivadeneira

# TRICOMONAS

## Contagio

Vía Sexual, objetos contaminados. Baños públicos.

## Sintomatología

- Trastornos digestivos.
- Hemorragias transvaginales, escozor y ardor zona pélvica.
- Un flujo vaginal espumoso, amarillo verdoso y con un fuerte olor.
- Molestias durante la relación sexual o al orinar, irritación y picazón en el área genital de la mujer.





\* *Válvula Iliocecal / Riñón derecho*

Dr. César Rivadeneira

---

# CIEGO – RIÑÓN DERECHO



PATÓGENO:

**TRICOMONAS 3** (Parásito)

# TRICOMONAS


## Contagio

Vía Sexual, objetos contaminados. Baños púbicos.



## Sintomatología

- Trastornos digestivos.
- Hemorragias transvaginales, escozor y ardor zona pélvica.
- Un flujo vaginal espumoso, amarillo verdoso y con un fuerte olor.
- Molestias durante la relación sexual o al orinar, irritación y picazón en el área genital de la mujer.

\* *Ciego / Ciego Válvula Iliocecal / Riñón derecho*



# COLON ASCENDENTE – RIÑÓN DERECHO



PATÓGENO:

**KLEBSIELLA PNEUMONIAE 1** (bacteria)

---

# KLEBSIELLA PNEUMONIAE

## Contagio



De persona a persona, vía fecal-oral,  
Alimentos, aguas contaminadas.

## Sintomatología

- Sangrados, colitis, mala digestión.
- Diabetes.
- Afección pulmonar bronquitis
- Afecta a la boca, halitosis
- Mastitis, flebitis
- Sordera



# COLON ASCENDENTE – HÍGADO



PATÓGENO:

**KLEBSIELLA 2** (bacteria)


# KLEBSIELLA

## Contagio

De persona a persona, vía fecal-oral, alimentos, aguas contaminadas. Se adquieren en el hospital durante tratamiento de enfermedades o procedimientos quirúrgicos.


## Sintomatología

- Sangrados, colitis, mala digestión.
- Mal funcionamiento hepático.
- Diabetes.
- Afección pulmonar bronquitis, afecta a la boca, halitosis
- Mastitis, flebitis, sordera



---

# COLON ASCENDENTE – COLON DESCENDENTE



PATOGENO:

**HERPES ZÓSTER** (Virus)

---

---


# HERPES ZÓSTER

## Contagio

Después de contraer varicela, el virus latente, se reactiva.


## Sintomatología

- Faja de la reina.
- Lesión en nervios intercostales u otros lugares, siempre solo un lado del cuerpo. Sarpullido cutáneo. Vesículas se van transformando en ampollas llenas de un fluido seroso.
- Muy doloroso.



---

# COLON TRANSVERSO - VEJIGA



PATÓGENO:

**VIBRIO CHOLERAЕ 1** (Bacteria)

---

---


# VIBRIO CHOLERAЕ

## Contagio

A través del agua y alimentos contaminados por heces de enfermos de cólera.


## Sintomatología

- Dolor de estómago, diarreas profusas, dolor de cabeza.
- Sangrado bucal, rectal.
- Colitis crónica, gases, hemorragia intestinal problemas en el tubo digestivo.



---

# COLON TRANSVERSO - HÍGADO



PATÓGENO:

**VIBRIO CHOLERAE 2** (Bacteria)

---


# VIBRIO CHOLERAE

## Contagio

Se transmite a través del agua y alimentos contaminados por heces de enfermos de cólera.


## Sintomatología

- Dolor de estómago, diarreas profusas, dolor de cabeza.
- Sangrado bucal, rectal.
- Colitis crónica, gases, hemorragia intestinal problemas en el tubo digestivo.



---

# COLON DESCEN. – COLON DESCEN.



PATÓGENO:

**ENTEROBACTER CLOACAE** (Bacteria)

---

Dr. César Rivadeneira

---

# ENTEROBACTER CLOACAE

## Contagio

Por moco de perro y gato.



## Sintomatología

- Produce vaginitis, hemorroides, problemas de duodeno, colon, recto y ano, colitis, diarreas, gases, mala absorción.
- Hemorragia vaginal, se confunde con cáncer uterino.



---

# COLON DESCENDENTE – HÍGADO



PATÓGENO:

**HEPATITIS A** (Virus)

---

Dr. César Rivadeneira

---


# HEPATITIS A

## Contagio



Alimentos contaminados, vía fecal-oral.

## Sintomatología

- Orina oscura
- Fatiga, inapetencia, debilidad, cansancio crónico.
- Picazón
- Fiebre baja
- Náusea y vómitos
- Heces de color arcilla o pálidas
- Piel amarilla (ictericia)



# COLON DESCEN. – RIÑÓN IZQUIERDO



PATÓGENO:

Dr. César Rivadeneira **PASTEURELLA** (Bacteria)

---


# PASTEURELLA

## Contagio


Alimentos contaminados, vía fecal-oral.

## Sintomatología

- Trastornos digestivos.
- Déficit proteico, diarreas
- Miopatías, debilidad músculos.
- Sangrado vaginal.
- Linfadenopatía regional, escalofríos y fiebre.



# CONTRA CIEGO - CONTRA CIEGO



PATÓGENO:

**BORDETELLA PERTUSSIS** (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

---

# BORDETELLA PERTUSSIS


## Contagio

Vía oral, verduras y frutas.

Gotitas nasales en el aire


## Sintomatología

- Problemas digestivos, gases, distensión abdominal, intolerancia a la leche, vaginal y diarrea.
- Necrosis de la cabeza del fémur lado izquierdo. Artrosis de cadera.
- Várices, hemorroides
- Tosferina, tos convulsa.



---

# COLON SIGMOIDEO - RECTO



PATÓGENO:

**VIRUS R - 40**

(Virus)

---


# VIRUS R - 40

## Contagio

Contaminación de la vacuna contra polio

## Sintomatología

- Problemas digestivos de absorción, urinarios, ginecológicos.
- Apareció por vacuna anti polio.
- Diarreas, moco intestinal, flatulencias, mala digestión.
- Se confunde con Papiloma.
- Potencial de causar tumores.



# EPIPLÓN - EPIPLÓN



PATÓGENO:

**ESTAFILOCOCO ALBUS** (Bacteria)

Dr. César Rivadeneyra

---


# ESTAFILOCOCO ALBUS

## Contagio

En una herida ya que es de flora normal.


## Sintomatología

- Acné vulgar.
- Los 4 juntos= alteración de páncreas que puede dar diabetes.



*Chequear escápula y rama isquiática.*

# ARCO COSTAL – ARCO COSTAL



PATÓGENO:

**PROTEUS MIRABILIS**  
Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)

---

# PROTEUS MIRABILIS

## Contagio

Residente del tracto intestinal del hombre.  
Mujeres por uretra corta.

## Sintomatología


- Da inmunodeficiencia, falso SIDA (síndrome de Daniel) al combinarse con otro virus. Por cercanía deprime al Timo.
- Afecta dependiendo el lugar donde se encuentre.



\* *Mediastino (2), sacro (2), cápsula renal (2)*  
*peroné (2)*

---

# COSTO DIAFRAGMÁTICO IZQ. - COSTO DIAFRAGMÁTICO IZQ.



PATÓGENO:

---

**TRYPANOSOMA CRUZI** (Parásito)

Dr. César Rivadeneira

# **TRYPANOSOMA CRUZI**

## **(mal de Chagas)**

### **Contagio**


Picadura de insecto, contacto directo  
heridas.

### **Sintomatología**

- Mal de Chagas
- Cardiopatía o insuficiencia cardiaca, inflamación de la cavidad pericárdica.
- Páncreas (diabetes), el riñón (insuficiencia renal).



# DIAFRAGMA - DIAFRAGMA



PATÓGENO:

**CANDIDA ALBICANS**  
Dr. César Rivadeneira

(Hongo)

---

# CÁNDIDA ALBICANS

## Contagio



Ropa, objetos, contacto sexual, sistema inmune deficiente.

## Sintomatología

- Algodoncillo, parálisis del diafragma al lastimar el bulbo.
- Micosis vaginal con olor a levadura, recto y ojo
- Lesiones cutáneas, prurito y sarpullido.



# DIAFRAGMA - RIÑÓN



PATÓGENO:

---

**BRUCELLA ABORTUS** (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

---


# BRUCELLA ABORTUS

## Contagio


Leche y carne mal cocida.

## Sintomatología

- Principal causa de abortos
- fiebre, artralgias, mialgias, sudores
- Su patología depende donde se ubique la bacteria
- Tendencia a la cronicidad



# ESTÓMAGO – PÍLORO



PATÓGENO:

---

**CLOSTRIDIUM PERFRINGES** (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

---


# CLOSTRIDIUM PERFRINGES

## Transmisión.



Transmitido por lácteos, carne contaminada, verduras.

## Sintomatología

- Muy agresivo.
- Afecta digestión, píloro, diarrea, intolerancia alimenticia.
- Gastritis, colitis.
- Distensión de abdomen, gases, diarrea, desnutrición, enanismo.
- Intolerancia a la lactosa.



# ESTÓMAGO - SACRO



PATÓGENO:

**CHLAMIDIA INTESTINALIS**

(Bacteria)

Dr. César Rivadeneira


# CHLAMIDIA INTESTINALIS

## Contagio



Por agua embotellada.

## Sintomatología

- Enfermedad silenciosa
- Trastornos digestivos, dolores, distensión abdominal.
- Gastritis crónica severa.



# ESTÓMAGO - SUPRARRENAL



PATÓGENO:

**SARAMPIÓN** (Virus)

Dr. César Rivadeneira

---

# SARAMPIÓN

## Contagio


Vía aérea

## Sintomatología

- Fiebre, tos, rinitis, conjuntivitis
- Exantema de arriba hacia abajo
- En el niño es pasajero, el adulto sangrado de tubo digestivo alto y da úlceras.
- Gastritis crónica severa,
- Conjuntivitis,
- Dermatitis atópica.
- Poliglobulia.



# ESTÓMAGO - TIMO



PATÓGENO:

---

**ESCHERICHIA TRANSGÉNICA (Bacteria)**

Dr. César Rivadeneira

# ESCHERICHIA TRANSGÉNICA

## Contagio


Alimentos industriales. Las bacterias E. coli, hay muchas cepas, usadas y manipuladas en forma intensiva y masiva por la industria.

## Sintomatología

- Diarrea hemorrágica, vómitos, irritabilidad, palidez, dificultad para orinar y a veces convulsiones.
- Puede ser letal y deja secuelas como insuficiencia renal o problemas neurológicos.



# HIATO -TESTE DERECHO



PATÓGENO:

**HELICOBACTER PILORY** (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

---


# HELICOBACTER PILORY

## Contagio

Vía oral


## Sintomatología

- Gastritis, luego úlcera gástrica.
- Epigastralgia, dolor y ardor.
- Mala digestión.
- Hernias diafragmáticas.
- Colitis.
- Altera la producción de espermas en el testículo.



---

# HIATO - ESÓFAGO



PATÓGENO:

---

**ENTEROBACTER NEUMONEAE 1**

Dr. César Rivadeneira


# ENTEROBACTER NEUMONEAE 1

## Contagio

Vía aérea: tos, gotitas flush


## Sintomatología

- Fiebre, escalofríos.
- Disnea, dolor torácico.
- Problemas pulmonares, traqueal, tos con expectoración.
- Malestar general.



---

# ESÓFAGO - ESÓFAGO



PATÓGENO:

---

**FASCIOLOPSIS BURSKII** (Parásito)

Dr. César Rivadeneira

---

# FASCIOLOPSIS BURSKII

## Contagio



Vía oral, vegetales contaminados.

## Sintomatología

- Problema traqueal, digestivo, cardiaco.
- Obstruye el flujo normal en el hígado.
- Hipoxia.
- Principal causante de arritmia.
- Edema, ascitis, anemia, anorexia.
- Simula hepatitis y cirrosis, ictericia, intolerancia alimenticia, desnutrición.



# ESÓFAGO - VEJIGA



PATÓGENO:

**HISTOPLASMA CAPSULATUM**

(Hongo)

Dr. César Rivadeneira

---


# HISTOPLASMA CAPSULATUM

## Contagio


Inhalación de microconidios del ambiente.

## Sintomatología

- En los inmuno deficientes.
- Infección pulmonar, enfermedad aguda de tipo gripal.
- A menudo auto limitada.



# PÁNCREAS CABEZA - PÍLORO



PATÓGENO:

**CLOSTRIDIUM DIFICCILE**

(Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

---

# CLOSTRODIUM DIFICCILE

## Contagio

Vía oral-fecal, contacto físico contaminado.


## Sintomatología

- Pancreatitis.
- Disfunción pancreática. Problemas digestivos.
- Diarrea mal oliente. Fiebre o calambres dolorosos en el abdomen. Náuseas o vómitos.
- Diabetes.



---

# PÁNCREAS CABEZA - PUNTA



PATÓGENO:

**ADENO VIRUS 36**

(Virus)

---


# ADENO VIRUS 36

## Contagio


Vía aérea, vía oral.

## Sintomatología

- Pancreatitis.
- Hipo calcemia
- Acumulan lípidos-grasas- rápidamente, incrementan número células adiposas contribuye a la obesidad mórbida.
- Diabetes.



# PÁNCREAS CABEZA – HÍGADO



PATÓGENO:

**ESTAPHYLOCOCO AUREUS COAGULA. +** (Bacteria)


# **ESTAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVO (+) HEPATITIS K**

## **Contagio**



Contaminación de heridas o quemaduras, material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados.

## **Sintomatología**

- Problemas digestivos.
- Cólicos y gases.
- La toxina va al Sistema Nervioso.
- Adherencias en útero o vagina.



# PÁNCREAS CABEZA – SUPRARRENAL



PATÓGENO:

**ESTAPHYLOCOCO AUREUS COAGULA.** - (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira


# **ESTAPHYLOCOCCUS AUREUS COAGULASA POSITIVO (-)**

## **Contagio**


Contaminación de heridas o quemaduras, material médico contaminado y la ingestión de alimentos o leche contaminados.

## **Sintomatología**

- Reflujo gastro-esofágico en niños.
- En adultos es causante de cáncer de cabeza de páncreas.
- Cólicos y gases.



# PÁNCREAS COLA - COLON DESC.



PATÓGENO:

**ANISAKIS**  
Dr. César Rivadeneira

(Parásito)

---

# ANISAKIS

## Contagio

Por mariscos, pescado crudo.


## Sintomatología

- Dolor abdominal, náusea, vómito.
- Si las larvas pasan al intestino, da una severa respuesta granulomatosa eosinofílica.
- Simula la enfermedad de Crohn.
- Da muchas alergias.



# PÁNCREAS COLA – HÍGADO

## Hepatitis H



PATÓGENO:

**CLOSTRIDIUM BOTULINUM** (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira


# CLOSTRIDIUM BOTULINUM

## Contagio


Embutidos, enlatados o envasados. Por heridas

## Sintomatología

- Existe una potente neurotóxica.
- Gastritis, desarreglos intestinales. Cólico abdominal, gases. Náuseas, Vómitos.
- Dificultad respiratoria, dificultad para el habla, visión doble,
- Debilidad con parálisis (igual en ambos lados del cuerpo).
- Puede producir metástasis.



# PÁNCREAS PUNTA - BAZO



PATÓGENO:

**VERRUGA COMÚN** (Virus)

Dr. César Rivadeneira

---

# VERRUGA COMÚN

## Contagio


De piel a piel, bajo riesgo de contagio.

## Sintomatología

Son pequeños crecimientos en la piel por lo regular indoloros causados por un virus. (HPV)



# PÁNCREAS - BAZO



PATÓGENO:

**ECHINOCOCCUS GRANULOSUS**

(Parasito)

Dr. César Rivadeneyra


# ECHINOCOCCUS GRANULOSUS

## Contagio


se transmite por perros y ganado ovino.

## Sintomatología

- Hidatidosis o "quiste hidatídico.
- El hígado y los pulmones son afectados más frecuentemente.
- Es una enfermedad grave, destructora. Los síntomas dependen de su localización.
- Granos.
- Diabetes.



# PERI PANCREÁTICO - PERI PANCREÁTICO



PATOGENO:

**RABIA 2** (Virus)  
Dr. César Rivadeneira


# RABIA VIRUS

## Contagio:


- Mordedura, vía epidérmica contacto con saliva infectada, vía respiratoria, vía digestiva por escoriaciones, trasplante de órganos.

## Sintomatología

- Alergia
- Intolerancia alimenticia
- Mal funcionamiento pancreático
- Falsa diabetes



# LIGAMENTO PANCREÁTICO - BAZO



PATÓGENO:

**VIRUS DEL NILO**

(Virus)

Dr. César Rivadeneira

---


# VIRUS DEL NILO

## Contagio

Picadura de mosquitos.


## Sintomatología

- Fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y la espalda, dolores musculares, cansancio, dolores en las articulaciones, rigidez en miembros inferiores.
- Ganglios inflamados, erupción en la piel.
- Encefalitis, meningitis.



# BAZO – BAZO

## Horizontal



PATÓGENO:

**YERSINIA PESTIS** (Bacteria)  
Dr. César Rivadeneira

---

# YERSINIA PESTIS


## Contagio

Picadura de pulgas contagiadas por ratas

## Sintomatología


- Peste neumónica, bubónica, y séptica.
- Falsa leucemia y anemia.
- Tos crónica, laringitis tipo bronquitis.
- Flujo vagina, azoospermia.
- Esplenomegalia.

*Chequear vagina/vagina y  
testículo/testículo.*



---

# BAZO - HÍGADO



PATÓGENO:

---

**BRUCELLA ABORTUS**

(Bacteria) *Dr. César Rivadeneira*

---


# BRUCELLA ABORTUS

## Contagio:


Respiratoria. Mucosas. Dérmica. Parenteral.  
Digestiva. Transplacentaria

## Sintomatología:

- Fiebre, artralgias, mialgias y diaforesis.
- Las manifestaciones dependen de la vía de transmisión: si es respiratoria, con neumonía, si entra por la piel: celulitis y linfadenopatía regional.



# COLON DESCENDENTE - ANO



PATÓGENO:

**CHIKUNGUNYA** (Virus)

Dr. César Rivadeneyra

# CHIKUNGUNYA VIRUS

## Contagio:

Se transmite por la picadura de los mosquitos; *Aedes aegypti* y *albopictus*.


## Sintomatología:

- Febril aguda dos a cinco días,
- Dolores articulares de las extremidades; puede persistir durante años.
- Dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.



---

# OMBLIGO / OMBLIGO



PATÓGENO:

---

**ESTREPTOCOCO D** (Bacteria)  
Dr. César Rivadeneira


# ESTREPTOCOCO D

## Contagio

Los enterococos se encuentra en la flora intestinal normal y la infección a menudo procede de contaminación fecal.

## Sintomatología

Infecciones del tracto urinario y también infecciones oportunistas (intra-abdominal, septicemia y endocarditis y hemolisis de tipo variable) Dolor abdominal, náusea, vómito.





La vida me  
enseñó que cada  
momento feliz...

...hay que  
disfrutarlo como  
si fuera el último



---

# PARES BIOMAGNÉTICOS REGULARES PELVIS




---

Dr. César Rivadeneira

---

# URETER – URETER



PATÓGENO:

---

**VARICELA**

Dr. César Rivadeneira

(Virus)

---


# VARICELA

## Contagio

Vía aérea, gotitas saliva huésped infectado

## Sintomatología

- Infertilidad en la mujer.
- Falsa endometriosis, salpingitis.
- Exantemática eruptiva de la infancia. Fiebre, cefalea, astenia, anorexia.
- Sarpullido, ampollas llenas de líquido y pruriginosas, sobre manchas rojas en la piel.
- Síndrome nefrótico, insuficiencia renal, cistitis, uretritis.
- Se confunde con herpes.



---

# VEJIGA - VEJIGA



PATÓGENO:

---

**ESTREPTOCOCO G** (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

---

# ESTREPTOCOCO G


## Contagio

Persona a persona, invasión de bacterias endógenas a sitios estériles



## Sintomatología

- Problemas renales.
- En niños y adultos: incontinencia urinaria.
- Vaginitis, uretritis.

*Combinado con el estreptococo A (braquial / braquial) da psoriasis.*



# Anexo (2)



PATÓGENO

**Paramyxo virus**

Dr. César Rivadeneira

---

# ANEXO - ANEXO

## Contagio



Se transmite por vía aérea.

## Sintomatología

- Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS)



# URETRA - URETRA



PATÓGENO:

**CORONA VIRUS** (Virus)  
Dr. César Rivadeneira

---


# CORONA VIRUS

## Contagio

Vía fecal-oral, se transmite por gatos y conejos.


## Sintomatología

- Uretritis, vaginitis, ardor, dolor.
- A veces sangrado por la uretra.
- Resfríos.



# CLÍTORIS / SACRO

---



PATÓGENO:

---

**ESPIROQUETA 3**  
Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)

---


# ESPIROQUETA 3

## Contagio

Por secreción de la piel afectada,  
contacto sexual.


## Sintomatología

- Produce diabetes falsa, sobrepeso, desactiva la producción de insulina.
- Trastornos pélvicos, irritación del clítoris.



---

# PUDENDO - PUDENDO



PATÓGENO:

---

**PAROTIDITIS Paramixovirus** (Virus)

Dr. César Rivadeneira

---


# PAROTIDITIS (PARAMIXOVIRUS)

## Contagio

Vía aérea, gotas de saliva.



## Sintomatología

- Paperas.
- Dolor de cabeza, malestar general,
- Dolor mandibular, principalmente al tacto.
- Afecta a los testículos y vejiga.
- Es causa de infertilidad, no impotencia.
- Falla producción de espermas.



\* *Chequear parótida/parótida*

# PUDENDO D - GLÚTEO I



PATÓGENO: *Sporothrix schenckii*

**ESPOROTRICOSES**

Dr. César Rivadeneira

(Hongo)


# ESPOROTRICOSIS

## *Sporothrix schenckii*

### Contagio

Pinchazo de rosa, frecuencia en campesinos y jardineros, el hongo se encuentra en la tierra y en material vegetal.

Sintomatología: Micosis subcutáneas, una reacción granulomatosa supurativa en los tejidos.




### Sintomatología

- Micosis subcutáneas, una reacción granulomatosa supurativa en los tejidos.

---

# TROMPA - TROMPA



PATÓGENO:

---

**PARVOVIRUS**  
Dr. César Rivadeneira

(Virus)


# PARVOVIRUS

## Contagio

Vía sexual, contacto con perros contaminados.


## Sintomatología

- Da infertilidad femenina.
- Trastornos de vejiga en el hombre, cistitis.
- Falso papiloma virus.
- Endometriosis falsa, miomas falsos que son hematomas.
- Puede producir flujo vaginal con mal olor.
- Amenorrea



# TESTÍCULO - TESTÍCULO

## (VAGINA (2) LABIO MAYOR INFERIOR (2))



PATÓGENO:  
**YERSINIA PESTIS**

Dr. César Rivadeneira

(Bacteria)


# YERSINIA PESTIS

## Contagio

Picadura de pulga de roedores contaminados.

## Sintomatología (*La Peste*)


- Flujo vaginal en la mujer y azoospermia en hombre. Frigidez
- Sepsis grave, adenopatía dolorosa y edema regional.
- Púrpura y lesiones de [gangrena] .  
Múltiples Hemorragias
- Postración. Shock y Delirio.



©1997 The Learning Company, Inc.

©1997 The Learning Company, Inc.

# PROSTATA (Periné) - RECTO



PATÓGENO:

**PAPILOMA VIRUS** (Virus)

Dr. César Rivadeneira

# PAPILOMA VIRUS (PVH)

## Contagio


Por vía sexual, instrumental contaminado

## Sintomatología:

- Verrugas vaginales o pene.
- Condilomas
- Despierta cáncer uterino.



# NERVIO INGUINAL - NERVIO INGUINAL



PATÓGENO:

**HTLV**  
Dr. César Rivadeneira

(Virus)


# HTLV 1

## Contagio


Por sangre, leche materno, semen, órganos de cuerpo, o otros tejidos.

## Sintomatología

- Problemas uretrales, vejiga, inflamaciones pélvicas. Dolores de espalda baja. Altera función sexual.
  - Leucemia linfoma de células T, ataca linfocitos T
- Síntomas Inmunológicos (Disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias) Infección vaginal, Lesiones dermatológicas en zona pélvica



# PUBIS - PUBIS



PATÓGENO:

**HTLV**  
Dr. César Rivadeneira

(Virus)


# HTLV

## Contagio



Por sangre, leche materno, semen, órganos de cuerpo, o otros tejidos.

## Sintomatología

- Problemas uretrales, vejiga, inflamaciones pélvicas. Dolores de espalda baja. Altera función sexual.
  - Leucemia linfoma de células T, ataca linfocitos T
- Síntomas Inmunológicos (Disminución de la respuesta inmunitaria en zona pélvica. Favorece infecciones genitourinarias) Infección vaginal, Lesiones dermatológicas en zona pélvica



# NERVIO INGUINAL - HÍGADO



PATÓGENO:  
**ROSEOLA**

(Virus)

---


# ROSEOLA

## Contagio



Por la saliva o las gotitas por estornudos o tos.  
También fecal-oral.

## Sintomatología

- Enfermedad de los niños
- Erupción transitoria o "exantema", luego de fiebre de tres días. aparece erupción roja dura entre 1 y 2 días.
- Dermatitis leve no específica.



# URÉTER IZQUIERDO - HÍGADO



PATÓGENO:  
**ESTAFILOCOCO**  
**EPIDERMIS** (Bacteria)

Dr. César Rivadeneira

---

# ESTAFILOCOCO EPIDERMIS


## Contagio

En una herida, es de flora normal.

Uso de mucho antibiótico, inmunidad deficiente.

## Sintomatología

Afecta cara, cuello, sangrado encías, gingivitis, mal aliento.



Lo que se hace en la Vida...  
tiene eco en la eternidad...

Dr. César Rivadeneira